

中文说明

TSUMURA 汉方十味败毒汤提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力人士的皮肤疾病，有发红、时有化脓的人士的以下各种症状：
化脓性皮肤疾病或急性皮肤疾病的初期、荨麻疹、湿疹或皮肤炎、脚气



注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - 肠胃弱的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 如果服用1个月左右（针对化脓性皮肤疾病或急性皮肤疾病初期服用时则服用1周左右）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- 服用本剂后，可能偶尔会发生症状恶化情况，在此情形下请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

〈用法用量的相关注意事项〉

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 1.75g:

日本药典桔梗	1.5g
日本药典柴胡	1.5g
日本药典川芎	1.5g
日本药典茯苓	1.5g
日本药典槲皮	1.5g
日本药典独活	0.75g
日本药典防风	0.75g
日本药典甘草	0.5g
日本药典荆芥	0.5g
日本药典生姜	0.5g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>