

中文说明

TSUMURA 汉方 麻子仁丸料 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于缓和中等体力以下，有时大便发硬结块的人士的以下各种症状：
便秘、伴随便秘的头沉・上火・湿疹・皮肤炎・痤疮（暗疮）・
食欲不振（食欲减退）・腹胀感・肠内异常发酵・痔疮等



注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

- 服用本药剂的期间，请勿服用以下药品：
其他泻药
- 哺乳期的人士请勿服用本药剂，或者服用本药剂期间请勿哺乳。

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱、容易腹泻的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
消化系统	伴随有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

- 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：
腹泻
- 如果服用 5~6 天症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前或用餐时凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 1.125g：

日本药典火麻仁	2.5 g
日本药典大黄	2.0 g
日本药典枳实	1.0 g
日本药典杏仁	1.0 g
日本药典厚朴	1.0 g
日本药典芍药	1.0 g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>