

한국어판

중장탕 라무르

[제 2 류 의약품]

효능·효과

혈도증, 냉증, 손발 저림, 월경불순, 냉, 두근거림, 숨참, 어지러움, 상기(기혈이 머리 쪽으로 치밀어 오름), 두통, 요통, 어깨결림, 부종, 혈액불량, 변비, 월경통
주) 혈도증이란 월경, 임신, 출산, 산후, 갱년기 등 여성 호르몬의 변화에 따라서 나타나는 정신불안, 초조함 등의 정신신경 증상 및 신체 증상을 말한다.



사용상 주의사항

□ 상담이 필요한 경우

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	구역질, 식욕부진

3. 어느 정도 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

용법·용량

다음 양을 공복 또는 취침 전에 물 또는 따뜻한 물과 함께 복용.

연령	1 회량	1 일 복용 횟수
만 15 세 이상	4 정	2 회
만 15 세 미만	복용하지 말 것	

성분·분량

본 제품 8 정에는 아래와 같은 비율의 혼합생약 건조 엑스 1000mg 을 함유합니다.

작약(일본약전)	1.60 g
당귀(일본약전)	1.60 g
계피(일본약전)	1.12 g
현호색(일본약전)	0.80 g
천궁(일본약전)	0.80 g
목단피(일본약전)	0.80 g
복령(일본약전)	0.64g
창출(일본약전)	0.48 g

지황(일본약전)	0.40 g
등피(일본약전)	0.40 g
감초(일본약전)	0.32 g
향부자(일본약전)	0.32 g
도인(일본약전)	0.32 g
황련(일본약전)	0.16 g
생강(일본약전)	0.08 g
정향(일본약전)	0.08 g
인삼(일본약전)	0.08 g

첨가물로 아라비아검분말(일본약전), 카르나우바 왁스(일본약전), 경질무수규산(일본약전), 스테아르산(일본약전), 스테아르산마그네슘(일본약전), 젤라틴(일본약전), 탈크(일본약전), 침강탄산칼슘(일본약전), 백당(일본약전), 히드록시프로필셀룰로오스(일본약전), 폴리옥시에틸렌(105) 폴리옥시프로필렌(5)글리콜, 폴리비닐아세탈디에틸아미노아세테이트를 함유합니다.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
2. 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 본 제품을 젖은 손으로 만지지 마십시오. 젖은 손으로 만지면 당의에 얼룩이 생기거나 변색될 수 있습니다.
4. 병 속에 있는 충전재는 운송 중에 정제가 파손되는 것을 방지하기 위해서 넣은 것이므로, 뚜껑을 개봉한 후에는 버려 주십시오.
5. 병 뚜껑을 제대로 닫지 않을 경우, 습기 등의 영향으로 정제가 변질될 수 있으므로 복용을 할 때마다 병 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.
6. 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 옮겨서 보관하지 말 것.
7. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산·판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>