


中文說明

TSUMURA 漢方小建中湯提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於體力虛弱、容易疲勞、有腹痛、血色不佳、時有伴隨心悸、手足煩熱、冷症、盜汗、鼻血、尿頻及多尿等症狀的人士的以下各種症狀：
小兒虛弱體質、疲勞乏力、慢性腸胃炎、腹痛、神經質、小兒夜尿症、夜啼



注意事項

×禁止事項

（如果不遵守，則目前的症狀有可能惡化，或容易引起副作用）

以下人士請勿服用：

出生後未滿3個月的嬰兒。

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 有噁心或嘔吐症狀的人士
- (4) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢

3. 如果服用1個月左右症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量，在餐前用涼開水或溫水送服：

年齡	1次用量	1天服用次數
7歲以上未滿15歲	1包（1.875g）	2次
4歲以上未滿7歲	2/3包	
2歲以上未滿4歲	1/2包	
未滿2歲	1/3包	

<用法用量的相關注意事項>

1. 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。
2. 未滿1歲的嬰兒請優先接受醫生的診治，只有在不得已的情形下方可喂服。

成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 0.9375g 和日本藥典飴糖 2.5g：

日本藥典芍藥	1.5g
日本藥典桂皮	1.0g
日本藥典大棗	1.0g
日本藥典甘草	0.5g
日本藥典生薑	0.25g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘製劑，請將袋口翻折保存，並於 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>