

中文说明

TSUMURA 汉方小建中汤提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于体力虚弱、容易疲劳、有腹痛、血色不佳、时有伴随心悸、手足烦热、冷症、盗汗、鼻血、尿频及多尿等症状的人士的以下各种症状：
小儿虚弱体质、疲劳乏力、慢性肠胃炎、腹痛、神经质、小儿夜尿症、夜啼



注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

以下人士请勿服用：

出生后未满 3 个月的婴儿。

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 有恶心或呕吐症状的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒

- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
7 岁以上未满 15 岁	1 包 (1.875g)	2 次
4 岁以上未满 7 岁	2/3 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/2 包	
未满 2 岁	1/3 包	

〈用法用量的相关注意事项〉

- 幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。
- 未满 1 岁的婴儿请优先接受医生的诊治，只有在不得已的情形下方可喂服。

成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 0.9375g 和日本药典饴糖 2.5g：

日本药典芍药	1.5g
日本药典桂皮	1.0g
日本药典大枣	1.0g
日本药典甘草	0.5g
日本药典生姜	0.25g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>