

## 中文說明

# TSUMURA 漢方五苓散料提取物顆粒

【第二類醫藥品】

### 功能和效果

可用於各種體力，口渴且尿量少的人士伴隨有眩暈、噁心、嘔吐、腹痛、頭痛、浮腫等某種症狀的以下各種症狀：

水樣性腹瀉、急性腸胃炎（裡急後重<sup>注</sup>）的人士請勿使用）、中暑、頭痛、浮腫、宿醉

注）裡急後重是指有殘便感，腹痛窘迫，時時欲便的症狀。



### 注意事項

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢

3. 如果服用 1 個月左右(針對急性腸胃炎、宿醉服用時則服用 5-6 次，針對水樣性腹瀉、中暑服用時則服用 5-6 天)症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 用法和用量

請按以下用量，在餐前用涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (2.5g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。

## 成分和含量

2 包本品 (5g) 中，含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 1.4g：

日本藥澤瀉	3.30g
日本藥典蒼朮	1.98g
日本藥典豬苓	1.98g
日本藥典茯苓	1.98g
日本藥典桂皮	1.32g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

## 保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘製劑，請將袋口翻折保存，並於 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>