

中文說明

TSUMURA 漢方桂枝加芍藥大黃湯提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於中等體力以下，有腹脹感、腹痛、便秘的人士的以下各種症狀：
便秘、裡急後重^{註)}

註) 裡急後重是指有殘便感，腹痛窘迫，時時欲便的症狀。



注意事項

×禁止事項

(如果不遵守，則目前的症狀有可能惡化，或容易引起副作用)

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用以下藥品：

其他瀉藥

2. 哺乳期的人士請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑期間請勿哺乳

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃虛弱、容易腹瀉的人士
- (4) 老年人
- (5) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- (6) 有以下症狀的人士：

浮腫

- (7) 被診斷為患有以下疾病的人士：

高血壓、心臟病、腎臟病

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	伴隨有劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外，還出現乏力感、肌肉痛，並逐漸增強

3. 服用後可能會出現以下症狀，如果此類症狀持續或增強，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

腹瀉

4. 如果服用 1 周左右(針對裡急後重服用時服用 5-6 天)症狀仍未好轉,請停止服用,持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
5. 如果需要長期連續服用,請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量,在餐前用涼開水或溫水送服:

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時,請在監護人的指導監督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中,含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 2.0g:

日本藥典芍藥	3.0g
日本藥典桂皮	2.0g
日本藥典大棗	2.0g
日本藥典甘草	1.0g
日本藥典大黃	1.0g
日本藥典生薑	0.5g

有關添加物:含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

1. 請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
2. 請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的,如袋中尚有剩餘製劑,請將袋口翻折保存,並於 2 天內服用完畢。
4. 本劑使用了生藥(藥用的草根樹皮等),因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況,但並不影響其功能和效果。
5. 請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號: 107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>