

中文说明

TSUMURA 汉方 乙字汤 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力以上，大便干硬、有便秘倾向的人士的以下各种症状：
痔疮（痔核）、肛裂、便秘、轻度的脱肛

注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

1. 服用本药剂的期间，请勿服用以下药品：
其他泻药
2. 哺乳期的人士请勿服用本药剂，或者服用本药剂期间请勿哺乳

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - (1) 正在接受医生治疗的人士
 - (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
 - (3) 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - (4) 肠胃弱、容易腹泻的人士
 - (5) 老年人
 - (6) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - (7) 有以下症状的人士：
浮肿
 - (8) 被诊断为患有以下疾病的人士：
高血压、心脏病、肾脏病
2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心、呕吐、食欲不振、伴随剧烈腹痛的腹泻、腹痛

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难，出现干咳、发热等症状，此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

3. 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员： 腹泻



4. 如果服用1个月左右（针对肛裂、便秘服用时则为5-6天）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。
5. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1次用量	1天服用次数
15岁及以上成人	1包（1.875g）	2次
7岁以上未满15岁	2/3包	
4岁以上未满7岁	1/2包	
2岁以上未满4岁	1/3包	
未满2岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的乙字汤提取物2.0g：

日本药典当归	3.0 g
日本药典柴胡	2.5 g
日本药典黄芩	1.5 g
日本药典甘草	1.0 g
日本药典升麻	0.5 g
日本药典大黄	0.25 g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>