

中文說明

TSUMURA 漢方當歸芍藥散料提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於體力虛弱、畏寒怕冷且有貧血傾向、容易疲勞，時有下腹疼痛、

頭沉、眩暈、肩酸、耳鳴、心悸等症人士的以下各種症狀：

月經不調、月經異常、痛經、更年期障礙、產前產後或流產引起

的不調不適（貧血、疲勞乏力、眩暈、浮腫）、眩暈或站起時眩暈、

頭沉、肩酸、腰痛、腰腿畏寒怕冷、凍傷、浮腫、斑點、耳鳴



注意事項

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 腸胃弱的人士
- (3) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或注

冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適

3. 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量，在餐前用涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的當歸芍藥散提取物 2.0g：

日本藥典芍藥	2.0g
日本藥典蒼朮	2.0g
日本藥澤瀉	2.0g
日本藥典茯苓	2.0g
日本藥典川芎	1.5g
日本藥典當歸	1.5g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘製劑，請將袋口翻折保存，並於 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥(藥用的草根樹皮等)，因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>