

中文說明

TSUMURA 漢方十味敗毒湯提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於中等體力人士的皮膚疾病，有發紅、時有化膿的人士的以下各種症狀：
化膿性皮膚疾病或急性皮膚疾病的初期、蕁麻疹、濕疹或皮膚炎、腳氣

注意事項

□諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - 正在接受醫生治療的人士
 - 孕婦或疑似懷孕的人士
 - 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
 - 腸胃弱的人士
 - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 如果服用1個月左右（針對化膿性皮膚疾病或急性皮膚疾病初期服用時則服用1周左右）症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- 服用本劑後，可能偶爾會發生症狀惡化情況，在此情形下請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量，在餐前用涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。



成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 1.75g：

日本藥典桔梗	1.5g
日本藥典柴胡	1.5g
日本藥典川芎	1.5g
日本藥典茯苓	1.5g
日本藥典槲皮	1.5g
日本藥典獨活	0.75g
日本藥典防風	0.75g
日本藥典甘草	0.5g
日本藥典荊芥	0.5g
日本藥典生薑	0.5g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘製劑，請將袋口翻折保存，並於 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>