

## 中文說明

# TSUMURA 漢方 半夏厚朴湯 提取物顆粒

【第二類醫藥品】

### 功能和效果

用於中等體力、情緒鬱結、咽喉或食道有異物感、時有伴隨心悸、眩暈、噁心等的人士的以下各種症狀：  
焦慮性神經症、神經性胃炎、孕吐、咳嗽、聲音沙啞、咽中如有物阻



### 注意事項

#### □諮詢事項

- 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - 正在接受醫生治療的人士
  - 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

| 相關部位 | 症 狀      |
|------|----------|
| 皮膚   | 發疹、發紅、瘙癢 |

- 如果服用 1 個月左右（針對孕吐服用時則為 5-6 天）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

### 用法和用量

請按以下用量、在餐前以涼開水或溫水送服：

| 年 齡          | 1 次用量          | 1 天服用次數 |
|--------------|----------------|---------|
| 15 歲及以上成人    | 1 包 ( 1.875g ) | 2 次     |
| 7 歲以上未滿 15 歲 | 2/3 包          |         |
| 4 歲以上未滿 7 歲  | 1/2 包          |         |
| 2 歲以上未滿 4 歲  | 1/3 包          |         |
| 未滿 2 歲       | 請勿服用           |         |

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時、請在監護人的指導監督下服用。

## 成分和含量

2 包本品 ( 3.75g ) 中、含有下述比例的半夏厚朴湯提取物 1.25g :

|         |       |
|---------|-------|
| 日本藥典半夏  | 3.0 g |
| 日本藥典茯苓  | 2.5 g |
| 日本藥典厚朴  | 1.5 g |
| 日本藥典紫蘇葉 | 1.0 g |
| 日本藥典生薑  | 0.5 g |

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物、蔗糖脂肪酸酯

## 保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的、如袋中尚有剩餘藥劑、請將袋口翻折保存、並在 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥 ( 藥用的草根樹皮等 )、因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況、但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>