

# 中文说明

## TSUMURA 汉方五苓散料提取物颗粒 A

【第二类医药品】

### 功能和效果

可用于各种体力，口渴且尿量少的人士伴随有眩晕、恶心、呕吐、腹痛、头痛、浮肿等某种症状的以下各种症状：

水样性腹泻、急性肠胃炎（里急后重<sup>注</sup>）的人士请勿使用）、中暑、头痛、浮肿、宿醉

注）里急后重是指有残便感，腹痛窘迫，时时欲便的症状。



### 注意事项

#### □咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- （1）正在接受医生治疗的人士
- （2）孕妇或疑似怀孕的人士
- （3）至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒

3. 如果服用 1 个月左右（针对急性肠胃炎、宿醉服用时则服用 5-6 次，针对水样性腹泻、中暑服用时则服用 5-6 天）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

### 用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包（1.875g）	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分和含量

2包本品（3.75g）中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 1.0g：

日本药泽泻	2.0g
日本药典苍术	1.5g
日本药典猪苓	1.5g
日本药典茯苓	1.5g
日本药典桂皮	0.75g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

## 保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>