

押してあける

第2類医薬品

[販売名]ツムラ漢方内服液麻黄湯

△【使用上の注意】

☒ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。

2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください

■ [相談すること]

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください（1）医師の治療を受けている人。（2）妊娠または妊娠していると思われる人。（3）胃腸の弱い人。（4）発汗傾向のある人。（5）高齢者。（6）今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人。（7）次の症状のある人。むくみ、排尿困難（8）次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品（箱）を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
その他	発汗過多、全身脱力感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルド	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や
ステロン症、ミオバチー	こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヶ月位（感冒、鼻かぜに服用する場合には5～6回）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品（箱）を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【用法・用量】

次の量を、食前または食間によく振ってから服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1本	3回
15歳未満	服用しないでください	

注）食間とは「食事と食事の間」のこと、たとえば朝食と昼食の間のことです。

食事中に服用するということではありません。

〈用法・用量に関連する注意〉

（1）用法・用量を厳守してください。

（2）本剤は、本質的に沈殿を含んでいますので、服用前によく振ってから服用してください。

【保管および取り扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）誤用を防げ、品質を保持するために他の容器に入れかえなさい。（4）使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。（5）瓶を開けたら飲みきってください。（6）瓶を開けたまま保存しないでください。

【包 装】30mL×3本入（1日分）

発売元



株式会社ツムラ

東京都港区赤坂2-17-11

〒107-8521

お客様相談窓口
電話 0120-329-930
<http://www.tsumura.co.jp/>

製造販売元 新生薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町清水谷1269

【効能・効果】

体力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしづしが痛く汗が出ていないものの次の諸症：感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

【成分・分量】

本品1日量90mL（30mL×3本）中、以下の生薬より抽出した麻黄湯エキス81mLを含有します。

日局マオウ……………5.0g

日局キョウニン……………5.0g

日局ケイヒ……………4.0g

日局カンゾウ……………1.5g

添加物として白糖、パラベン、香料（エタノール、グリセリン、プロピレングリコール、メントールを含む）を含有します。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931