

## 中文說明

# TSUMURA 漢方麻黃湯提取物顆粒

【第二類醫藥品】

### 功能和效果

用於體力充沛，感冒初期、風寒發熱、有頭痛、咳嗽、身體關節痛而不出汗的人士的以下各種症狀：  
感冒、傷風、支氣管炎、鼻塞

### 注意事項

#### ×禁止事項

（如果不遵守，則目前的症狀有可能惡化，或容易引起副作用）

以下人士請勿服用：

身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）。

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- （1）正在接受醫生治療的人士
- （2）孕婦或疑似懷孕的人士
- （3）腸胃弱的人士
- （4）容易出汗的人士
- （5）老年人
- （6）至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
- （7）有以下症狀的人士：  
排尿困難
- （8）被診斷為患有以下疾病的人士：  
高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	噁心、食欲不振、胃部不適
其 他	出汗過多、全身無力感

3. 如果服用 1 個月左右（針對感冒、傷風服用時則服用 5~6 次）症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。



## 用法和用量

請按以下用量，在餐前用涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。

## 成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的麻黃湯提取物 0.875g：

日本藥典杏仁	2.5g
日本藥典麻黃	2.5g
日本藥典桂皮	2.0g
日本藥典甘草	0.75g

有關添加物：含有日本藥典輕質無水矽酸、日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

## 保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘製劑，請將袋口翻折保存，並於 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>