

## 中文說明

# TSUMURA 漢方口服液麥門冬湯 S

【第二類醫藥品】

### 功能和效果

用於中等以下體力，不斷有痰，時有劇烈咳嗽，或者咽部有乾燥感的人士的以下各種症狀：  
乾咳、支氣管炎、支氣管哮喘、咽炎、聲音沙啞



### 注意事項

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 水樣痰多的人士
- (4) 老年人
- (5) 有以下症狀的人士：  
浮腫
- (6) 被診斷為患有以下疾病的人士：  
高血壓、心臟病、腎臟病

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本產品（盒子）諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
消化系統	食欲不振、胃部不適

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症 狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難，出現乾咳、發熱等症狀，此類症狀會突然出現或持續
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外，還出現乏力感、肌肉痛，並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等

3. 如果服用 1 個月左右（針對乾咳服用時則為 1 周左右）症狀仍未好轉，請停止服用，持本產品（盒子）諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

4. 如果需要長期連續服用，請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

## 用法和用量

請按以下用量，在餐前或餐間充分搖勻後服用：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 瓶	3 次
未滿 15 歲	請勿服用	

註) 餐間是指“兩餐之間”，例如早餐和午餐之間。

不是指在用餐過程中服用。

<用法用量的相關注意事項>

(1)請嚴格遵守用法和用量。

(2)本劑本質上含有沉澱，因此服用前請先充分搖勻後服用。

## 成分和含量

本品 1 天用量 90mL (30mL×3 瓶) 中，含有從下述生藥中提取的麥門冬湯提取物 81mL：

日本藥典麥冬	10.0g
日本藥典粳米	5.0g
日本藥典半夏	5.0g
日本藥典大棗	3.0g
日本藥典甘草	2.0g
日本藥典人參	2.0g

有關添加物：含有 D-山梨醇、白糖、對羥基本甲酸酯、香料 (含乙醇)

## 注意事項

- (1)由於可能會有不適合服用的情形，因此服用前請先諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- (2)服用時，請仔細閱讀盒子背面的說明書。
- (3)請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- (4)請於幼兒無法觸及之處保存。
- (5)為避免誤用及為保持品質，請勿轉放入其他容器。
- (6)請勿服用已過保質期的產品。
- (7)開瓶後請全部喝完。
- (8)請勿在開瓶後的狀態下保存。

## 淨含量

30mL×3 瓶裝 (1 天用量)

## 製造銷售商

新生藥品工業株式會社 奈良縣高市郡高取町清水谷 1269

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>