


# 中文说明

## TSUMURA 汉方桃核承气汤提取物颗粒

【第二类医药品】

### 功能和效果

用于中等体力以上，上火且经常便秘的人士的以下各种症状：  
月经不调、月经困难症、痛经、月经时或产后的精神不稳定、腰痛、便秘、  
高血压的伴随症状（头痛、眩晕、肩酸）、痔疮、碰撞挫伤症



### 注意事项

#### ×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

1. 服用本药剂的期间，请勿服用以下药品：

其他泻药

2. 哺乳期的人士请勿服用本药剂，或者服用本药剂期间请勿哺乳

#### □咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
- (4) 肠胃弱、容易腹泻的人士
- (5) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	伴随有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

3. 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员： 腹泻

4. 如果服用1个月左右（针对便秘服用时则为5-6天）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

5. 服用本剂后，如出现意外出血时，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员

## 用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的桃核承气汤提取物 1.5g：

日本药典桃仁	2.5g
日本药典桂皮	2.0g
日本药典大黄	1.5g
日本药典甘草	0.75g
日本药典无水芒硝	0.45g

有关添加物：含有日本药典轻质无水硅酸、日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

## 保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>