


한국어판

쯔무라 한방 소풍산 엑스 과립

[제 2 류 의약품]

효능·효과

체력이 중간 이상인 사람의 피부 질환으로, 가려움이 심하고
분비물이 많으며 때때로 국소적 열감이 있는 사람의
다음과 같은 증상:
습진, 피부염, 두드러기, 무좀, 땀띠



사용상 주의사항

□ 상담이 필요한 경우

- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성.
 - 몸이 허약한 사람(체력이 쇠약해진 사람, 몸이 약한 사람).
 - 위장이 약하고 쉽게 설사를 하는 사람.

- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

관련 부위	증상
소화기	식욕부진, 위부불쾌감, 복통

- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속 또는 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

설사

- 1 개월 정도 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

- 이 약의 복용에 의해 드물게 증상이 심해지는 경우가 있으므로, 이런 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

용법·용량

다음 양을 식전에 물 또는 따뜻한 물과 함께 복용

연령	1 회량	1 일 복용 횟수
만 15 세 이상	1 포(1.875g)	2 회
만 7 세 이상 만 15 세 미만	2/3 포	
만 4 세 이상 만 7 세 미만	1/2 포	
만 2 세 이상 만 4 세 미만	1/3 포	
만 2 세 미만	복용하지 말 것	

<용법·용량에 관한 주의 사항>

소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용

성분·분량

본 제품 2포(3.75g)에는 아래와 같은 비율의 혼합생약의 건조 엑스 2.0g 을 함유합니다.

지황(일본약전)	1.5 g
석고(일본약전)	1.5 g
당귀(일본약전)	1.5 g
우방자(일본약전)	1.0 g
창출(일본약전)	1.0 g
방풍(일본약전)	1.0 g
목통(일본약전)	1.0 g
호마(일본약전)	0.75 g
지모(일본약전)	0.75 g
감초(일본약전)	0.5 g
고삼(일본약전)	0.5 g
형개(일본약전)	0.5 g
설탕	0.5 g

첨가물로 경질무수규산(일본약전), 스테아르산마그네슘(일본약전), 유당수화물(일본약전)을 함유합니다.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
2. 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 1 포를 분할한 후 잔량을 사용할 경우에는 입구를 접어서 보관하고, 2일 이내에 복용할 것.
4. 이 약은 생약(약용 초근목피 등)을 사용한 제품이므로 제품에 따라 다소 과립의 색조 등이 다를 수 있으나, 효능·효과에 차이는 없습니다.
5. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산·판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>