

中文说明

TSUMURA 汉方 润肠汤 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力或稍显虚弱、时有皮肤干燥等证候的人士的以下症状：
便秘

注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

- 服用本药剂的期间，请勿服用以下药品：
其他泻药
- 哺乳期的人士请勿服用本药剂，或者服用本药剂期间请勿哺乳。

□咨询事项


- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - 肠胃弱、容易腹泻的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
消化系统	食欲不振、胃部不适、伴随有剧烈腹痛的腹泻、腹痛

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状，此类症状会突然出现或持续
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：
腹泻
- 服用一周症状仍未好转，请持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。



用法和用量

请按以下用量，在餐前或用餐时凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 2.5g：

日本药典地黄	3.0g
日本药典当归	1.5g
日本药典黄芩	1.0g
日本药典枳实	1.0g
日本药典杏仁	1.0g
日本药典厚朴	1.0g
日本药典大黄	1.0g
日本药典桃仁	1.0g
日本药典火麻仁	1.0g
日本药典甘草	0.75g

有关添加物：含有日本药典轻质无水硅酸、日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>