

한국어판

쯔무라 한방 제제

쯔무라 한방 인삼영양탕 엑스 과립

[제 2 류 의약품]

효능·효과

체력이 허약한 사람의 다음과 같은 증상: 병후, 수술 후 등의 체력저하, 피로권태, 식욕부진, 도한(盜汗, 야간에 자는 동안 땀이 나지만 느끼지 못하고 깨어나면 땀이 그치는 증상), 수족냉증, 빈혈

사용상 주의사항

□상담이 필요한 경우


- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.
 - 의사의 치료를 받고 있는 사람.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성.
 - 위장이 약하고 설사를 자주하는 사람.
 - 지금까지 약 등으로 인해 발진, 발적, 가려움 등이 발생한 적이 있는 사람.
- 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	위부불쾌감

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받아야 합니다.

증상의 명칭	증상
간기능장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부나 눈의 흰자가 노랗게 됨), 갈색 소변, 전신의 나른함, 식욕부진 등이 나타난다.

- 1 개월 정도 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.



용법 · 용량

다음 양을 식전에 또는 식간에 물 또는 따뜻한 물과 함께 복용

연령	1 회량	1 일 복용 횟수
만 15 세 이상	1 포(2.25g)	2 회
만 7 세 이상 만 15 세 미만	2/3 포	
만 4 세 이상 만 7 세 미만	1/2 포	
만 2 세 이상 만 4 세 미만	1/3 포	
만 2 세 미만	복용하지 말 것	

<용법 · 용량에 관한 주의 사항>

소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용

성분 · 분량

본 제품 2 포(4.5g)에는 아래와 같은 비율의 혼합생약 건조 엑스 3.0g 을 함유합니다.

지황(일본약전)	2.0g
당귀(일본약전)	2.0g
백출(일본약전)	2.0g
복령(일본약전)	2.0g
인삼(일본약전)	1.5g
계피(일본약전)	1.25g
원지(일본약전)	1.0g
작약(일본약전)	1.0g
진피(일본약전)	1.0g
황기(일본약전)	0.75g
감초(일본약전)	0.5g
오미자(일본약전)	0.5g

첨가물로 스테아르산마그네슘(일본약전), 유당수화물(일본약전)을 함유합니다.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 1 포를 분할한 후 잔량을 복용할 경우에는 입구를 접어서 보관하고, 2 일 이내에 복용할 것.
4. 이 약은 생약(약용 초근목피 등)을 사용한 제품이므로 제품에 따라 다소 과립의 색조 등이 다를 수 있으나, 효능 · 효과에 차이는 없습니다.
5. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산 · 판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>