

中文說明

TSUMURA 漢方桔梗湯含片

【第二類醫藥品】

功能和效果

無論體力如何，適用咽喉腫痛、時有咳嗽的人士的以下各種症狀：
扁桃體炎、扁桃體周圍膿腫

注意事項

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃虛弱、容易腹瀉的人士
- (4) 老年人
- (5) 至今曾有過因藥物等而引起過敏症狀的人士
- (6) 有以下症狀的人士：

浮腫

- (7) 被診斷為患有以下疾病的人士：

高血壓、心臟病、腎臟病

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
消化系統	食欲不振、胃部不適

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外，還出現乏力感、肌肉痛，並逐漸增強

3. 如果服用 5-6 次症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

4. 如果需要長期連續服用，請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量，在餐間或者餐前一片片分次含入口中，不要咀嚼，在口中緩慢溶解服用：

年齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	2 片	3 次
5 歲以上未滿 15 歲	1 片	
未滿 5 歲	請勿服用	



<用法用量的相關注意事項>

1. 幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。
2. 請勿咬碎或者吞服。

<含片取出方法>

請如右圖所示以指尖用力按壓裝有含片的 PTP 鋁箔的凸出部分，弄破背面的鋁箔，去除鋁箔取出含片後服用。

(如果誤將含片直接吞服，可能會導致扎進食道粘膜等意外事故。)

成分和含量

6片本片(6600mg)中，含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 625mg：

日本藥典甘草	1.5g
日本藥典桔梗	1.0g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鈣、日本藥典精製白糖、日本藥典羥丙基纖維素、阿拉伯膠、赤蘚糖醇、矽酸鈣、糊精、粉末還原麥芽糖水飴、香料。

保管及使用注意事項

1. 請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
2. 請於幼兒無法觸及之處保存。
3. 為避免誤用及為保持品質，請勿轉放入其他容器。
4. 本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的含片可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
5. 請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>