

한국어판

라무르 Q

[제②류 의약품]

효능·효과

갱년기장애, 혈도증, 월경불순, 냉증 및 이에 수반되는

다음과 같은 여러 증상:

월경통, 요통, 두통, 머리 무거움, 상기(기혈이 머리 쪽으로
치밀어 오름), 어깨결림, 이명, 어지러움, 가슴 두근거림, 숨참,
불면, 히스테리, 피로감, 혈색불량

주) 혈도증이란 월경, 임신, 출산, 산후, 갱년기 등 여성 호르몬의
변화에 따라서 나타나는 정신불안, 초조함 등의 정신신경 증상 및
신체 증상을 말한다.



사용상 주의사항

□ 상담이 필요한 경우

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.
- (2) 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람.

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

| 관련 부위 | 증상 |
|-------|-------------|
| 피부 | 발진, 발적, 가려움 |
| 소화기 | 구역질, 식욕부진 |

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속 또는 심해지는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

연변, 설사

4. 어느 정도 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

용법·용량

다음 양을 공복 또는 취침 전에 물 또는 따뜻한 물과 함께 복용.

| 연령 | 1 회량 | 1 일 복용 횟수 |
|-----------|----------|-----------|
| 만 15 세 이상 | 2 정 | 2 회 |
| 만 15 세 미만 | 복용하지 말 것 | |

성분 · 분량

본 제품 4 정에는

| | |
|-----------|-------|
| 현호색(일본약전) | 0.91g |
| 길초근(일본약전) | 0.61g |
| 작약(일본약전) | 0.61g |
| 당귀(일본약전) | 0.61g |
| 계피(일본약전) | 0.43g |
| 천궁(일본약전) | 0.30g |
| 목단피(일본약전) | 0.30g |
| 복령(일본약전) | 0.24g |
| 창출(일본약전) | 0.18g |
| 지황(일본약전) | 0.15g |
| 진피(일본약전) | 0.15g |
| 감초(일본약전) | 0.12g |
| 향부자(일본약전) | 0.12g |
| 도인(일본약전) | 0.12g |
| 황련(일본약전) | 0.06g |
| 생강(일본약전) | 0.03g |
| 정향(일본약전) | 0.03g |
| 인삼(일본약전) | 0.03g |

이상의 비율로 혼합생약 건조 엑스 500mg 과

| | |
|-----------------------|------|
| 센나엽 엑스 | 25mg |
| 토코페롤호박산에스테르칼슘(일본약전) | 10mg |
| 니코틴산아미드(일본약전) | 10mg |
| 판토텐산칼슘(일본약전) | 10mg |
| 엽산(일본약전) | 5mg |
| 티아민질산염(V.B1) (일본약전) | 5mg |
| 피리독신염산염(V.B6) (일본약전) | 1mg |
| 리보플라빈(V.B2) (일본약전) | 1mg |
| 시아노코발라민(V.B12) (일본약전) | 10µg |

을 함유하는 담적색 필름코팅정입니다.

첨가물로 경질무수규산(일본약전), 결정셀룰로오스(일본약전), 산화티탄(일본약전), 스테아르산마그네슘(일본약전), 탈크(일본약전), 덱스트린(일본약전), 하이드록시프로필메틸셀룰로스(일본약전), 마크로콜 6000(일본약전), 황색삼이산화철, 삼이산화철을 함유합니다.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에서 뚜껑을 확실히 닫고 보관할 것.
2. 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 본 제품을 젖은 손으로 만지지 마십시오. 젖은 손으로 만지면 필름에 얼룩이 생기거나 변색될 수 있습니다.
4. 병 속에 있는 건조탈취제는 복용하지 말 것.
5. 병 속에 있는 충전제는 운송 중에 정제가 파손되는 것을 방지하기 위해서 넣은 것이므로, 뚜껑을 개봉한 후에는 버려 주십시오. 단, 건조탈취제는 병에 넣은 상태로 보관하십시오.
6. 병 뚜껑을 제대로 닫지 않을 경우, 습기 등의 영향으로 정제가 변질될 수 있으므로 복용을 할 때마다 병 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.
7. 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 옮겨서 보관하지 말 것.
8. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산·판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>