

# 中文说明

## TSUMURA 汉方五苓散料提取物颗粒


【第二类医药品】

### 功能和效果

可用于各种体力，口渴且尿量少的人士伴随有眩晕、恶心、呕吐、腹痛、头痛、浮肿等某种症状的以下各种症状：

水样性腹泻、急性肠胃炎（里急后重<sup>注</sup>）的人士请勿使用）、中暑、头痛、浮肿、宿醉

注）里急后重是指有残便感，腹痛窘迫，时时欲便的症状。



### 注意事项

#### □咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症 状      |
|------|----------|
| 皮 肤  | 发疹、发红、瘙痒 |

3. 如果服用 1 个月左右（针对急性肠胃炎、宿醉服用时则服用 5-6 次，针对水样性腹泻、中暑服用时则服用 5-6 天）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

## 用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

| 年 龄          | 1 次用量      | 1 天服用次数 |
|--------------|------------|---------|
| 15 岁及以上成人    | 1 包 (2.5g) | 2 次     |
| 7 岁以上未满 15 岁 | 2/3 包      |         |
| 4 岁以上未满 7 岁  | 1/2 包      |         |
| 2 岁以上未满 4 岁  | 1/3 包      |         |
| 未满 2 岁       | 请勿服用       |         |

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

## 成分和含量

2 包本品 (5g) 中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 1.4g：

|        |       |
|--------|-------|
| 日本药泽泻  | 3.30g |
| 日本药典苍术 | 1.98g |
| 日本药典猪苓 | 1.98g |
| 日本药典茯苓 | 1.98g |
| 日本药典桂皮 | 1.32g |

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

## 保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>