

中文说明

TSUMURA 汉方桂枝茯苓丸料提取物颗粒 A


【第二类医药品】

功能和效果

比较有体力，时有下腹疼痛、肩酸、头沉、眩晕、上火且脚冰冷等症人士的
以下各种症状：

月经不调、月经异常、痛经、更年期障碍、女性荷尔蒙失调症^{注)}、肩酸、眩晕、
头沉、跌打损伤（碰撞挫伤症）、冻伤、斑点、湿疹或皮肤炎、暗疮
注)

女性荷尔蒙失调症是指伴随月经、怀孕、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙
变化而出现的精神不稳定或焦虑等精神神经症状及身体症状



注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症 状 |
|------|----------|
| 皮 肤 | 发疹、发红、瘙痒 |
| 消化系统 | 食欲不振 |

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

| 症状名称 | 症 状 |
|-------|---------------------------------------|
| 肝功能障碍 | 出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等 |

- 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：腹泻
- 如果服用1个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

| 年 龄 | 1 次用量 | 1 天服用次数 |
|--------------|--------------|---------|
| 15 岁及以上成人 | 1 包 (1.875g) | 2 次 |
| 7 岁以上未满 15 岁 | 2/3 包 | |
| 4 岁以上未满 7 岁 | 1/2 包 | |
| 2 岁以上未满 4 岁 | 1/3 包 | |
| 未满 2 岁 | 请勿服用 | |

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的桂枝茯苓丸提取物 0.875g：

| | |
|---------|------|
| 日本药典桂皮 | 1.5g |
| 日本药典芍药 | 1.5g |
| 日本药典桃仁 | 1.5g |
| 日本药典茯苓 | 1.5g |
| 日本药典牡丹皮 | 1.5g |

有关添加物：含有日本药典轻质无水硅酸、日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>