

中文說明

TSUMURA 漢方口服液麻黃湯

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於體力充沛，感冒初期、風寒發熱、有頭痛、咳嗽、身體關節痛而不出汗的人士的以下各種症狀：

感冒、傷風、支氣管炎、鼻塞

注意事項

×禁止事項

（如果不遵守，則目前的症狀有可能惡化，或容易引起副作用）

1. 以下人士請勿服用：
身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
2. 僅限短期服用，請勿連續服用

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
 - (1) 正在接受醫生治療的人士
 - (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
 - (3) 腸胃弱的人士
 - (4) 容易出汗的人士
 - (5) 老年人
 - (6) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
 - (7) 有以下症狀的人士：
浮腫、排尿困難
 - (8) 被診斷為患有以下疾病的人士：
高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本產品（盒子）諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	噁心、食欲不振、胃部不適
其 他	出汗過多、全身無力感

偶爾可能會發生以下嚴重症狀。此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症 狀
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外，還出現乏力感、肌肉痛，並逐漸增強

3. 如果服用 1 個月左右（針對感冒、傷風服用時則服用 5-6 次）症狀仍未好轉，請停止服用，持本產品（盒子）諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。



用法和用量

請按以下用量，在餐前或餐間充分搖勻後服用：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 瓶	3 次
未滿 15 歲	請勿服用	

註) 餐間是指“兩餐之間”，例如早餐和午餐之間。

不是指在用餐過程中服用。

<用法用量的相關注意事項>

- (1) 請嚴格遵守用法和用量。
- (2) 本劑本質上含有沉澱，因此服用前請先充分搖勻後服用。

成分和含量

本品 1 天用量 90mL (30mL×3 瓶) 中，含有從下述生藥中提取的麻黃湯提取物 81mL：

日本藥典麻黃	5.0g
日本藥典杏仁	5.0g
日本藥典桂皮	4.0g
日本藥典甘草	1.5g

有關添加物：含有白糖、對羥基本甲酸酯、香料（含乙醇、甘油、1,2-丙二醇、薄荷醇）

注意事項

(1) 以下人士請勿服用：

身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）

- (2) 由於可能會有不適合服用的情形，因此服用前請先諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
- (3) 服用時，請仔細閱讀盒子背面的說明書。
- (4) 請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- (5) 請於幼兒無法觸及之處保存。
- (6) 為避免誤用及為保持品質，請勿轉放入其他容器。
- (7) 請勿服用已過保質期的產品。
- (8) 開瓶後請全部喝完。
- (9) 請勿在開瓶後的狀態下保存。

淨含量

30mL×3 瓶裝（1 天用量）

製造銷售商

新生藥品工業株式會社 奈良縣高市郡高取町清水谷 1269

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>