

中文说明

TSUMURA 汉方口服液麦门冬汤 S

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等以下体力，不断有痰，时有剧烈咳嗽，或者咽部有干燥感的人士的以下各种症状：

干咳、支气管炎、支气管哮喘、咽炎、声音沙哑



注意事项

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 水样痰多的人士
- (4) 老年人
- (5) 有以下症状的人士：
 浮肿
- (6) 被诊断为患有以下疾病的人士：
 高血压、心脏病、肾脏病

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本产品（盒子）咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
消化系统	食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难，出现干咳、发热等症状，此类症状会突然出现或持续
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

3. 如果服用1个月左右（针对干咳服用时则为1周左右）症状仍未好转，请停止服用，持本产品（盒子）咨询医生、药剂师或注册销售人员。

4. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前或餐间充分摇匀后服用：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 瓶	3 次
未满 15 岁	请勿服用	

注) 餐间是指“两餐之间”，例如早餐和午餐之间。

不是指在用餐过程中服用。

<用法用量的相关注意事项>

- (1) 请严格遵守用法和用量。
- (2) 本剂本质上含有沉淀，因此服用前请先充分摇匀后服用。

成分和含量

本品 1 天用量 90mL (30mL×3 瓶) 中，含有从下述生药中提取的麦门冬汤提取物 81mL：

日本药典麦冬	10.0g
日本药典粳米	5.0g
日本药典半夏	5.0g
日本药典大枣	3.0g
日本药典甘草	2.0g
日本药典人参	2.0g

有关添加物：含有 D-山梨醇、白糖、对羟基苯甲酸酯、香料（含乙醇）

注意事项

- (1) 由于可能会有不适合服用的情形，因此服用前请先咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- (2) 服用时，请仔细阅读盒子背面的说明书。
- (3) 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
- (4) 请在幼儿无法触及之处保存。
- (5) 为避免误用及为保持品质，请勿转放入其他容器。
- (6) 请勿服用已过保质期的产品。
- (7) 开瓶后请全部喝完。
- (8) 请勿在开瓶后的状态下保存。

净含量

30mL×3 瓶装 (1 天用量)

制造销售商

新生药品工业株式会社 奈良县高市郡高取町清水谷 1269

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>