

中文說明

TSUMURA 漢方 釣藤散 提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於中等體力、有慢性頭痛、眩暈、肩酸等症狀的人士的
以下各種症狀：

慢性頭痛、神經症、有高血壓傾向的人士



注意事項

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃弱、畏寒怕冷的人士
- (4) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適

3. 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量、在餐前以涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時、請在監護人的指導監督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中、含有下述比例的釣藤散提取物 2.25g :

日本藥典石膏	2.5 g
日本藥典鉤藤	1.5 g
日本藥典陳皮	1.5 g
日本藥典麥冬	1.5 g
日本藥典半夏	1.5 g
日本藥典茯苓	1.5 g
日本藥典菊花	1.0 g
日本藥典人參	1.0 g
日本藥典防風	1.0 g
日本藥典甘草	0.5 g
日本藥典生薑	0.5 g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘藥劑、請將袋口翻折保存、並在 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥(藥用的草根樹皮等)、因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況、但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品、

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11

<https://www.tsumura.co.jp/>