

中文说明

TSUMURA 汉方 抑肝散 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力，有神经亢奋、易怒、烦躁等证候的人士的以下各种症状：

神经症、失眠症、小儿夜啼、小儿惊风（神经过敏）、磨牙症、更年期障碍、血道症^{注1)}

^{注1)} 血道症是指：随着月经、妊娠、分娩、产后、更年期等女性荷尔蒙变动而出现的精神不安、烦躁焦虑等精神神经症状及身体症状。



注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

以下人士请勿服用：

出生后未满3个月的婴儿。

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
间质性肺炎	上楼梯或稍做剧烈运动就会气喘、呼吸困难、出现干咳、发热等症状，此类症状会突然出现或持续
心力衰竭	一运动就呼吸困难、容易疲劳、脚浮肿、体重激增
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 如果服用1个月左右（针对小儿夜啼服用时则为1周左右）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	1/4 包	

<用法用量的相关注意事项>

1. 幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。
2. 未满 1 岁的婴儿请优先接受医生的诊治、只有在不得已的情况下方可喂服。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的抑肝散提取物 (1/2 量) 1.625g:

日本药典苍术	2.0 g
日本药典茯苓	2.0 g
日本药典川芎	1.5 g
日本药典钩藤钩	1.5 g
日本药典当归	1.5 g
日本药典柴胡	1.0 g
日本药典甘草	0.75 g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>