

中文说明

TSUMURA 汉方 人参养荣汤 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于体力虚弱的人士的以下各种症状：
病后或术后等情形下的体力衰弱、疲劳乏力、食欲不振、盗汗、手脚发凉、贫血

注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱、容易腹泻的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 如果服用 1 个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。


用法和用量

请按以下用量，在餐前或用餐时凉开水或温水送服：

年龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (2.25g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。



成分和含量

2包本品（4.5g）中，含有下述比例的混合生药干燥提取物 3.0g:

日本药典地黄	2.0 g
日本药典当归	2.0 g
日本药典白术	2.0 g
日本药典茯苓	2.0 g
日本药典人参	1.5 g
日本药典桂皮	1.25 g
日本药典远志	1.0 g
日本药典芍药	1.0 g
日本药典陈皮	1.0 g
日本药典黄芪	0.75 g
日本药典甘草	0.5 g
日本药典五味子	0.5 g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折保存，并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>