

中文說明

TSUMURA 漢方 麻子仁丸料 提取物顆粒

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於緩和中等體力以下，有時大便發硬結塊的人士

的以下各種症狀：

便秘、伴隨便秘的頭沉・上火・濕疹・皮膚炎・痤瘡

（暗瘡）・食欲不振（食欲減退）・腹脹感・腸內異

常發酵・痔瘡等



注意事項

×禁止事項

（如果不遵守，則目前的症狀有可能惡化，或容易引起副作用）

1.服用本藥劑的期間，請勿服用以下藥品：

其他瀉藥

2.哺乳期的人士請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑期間請勿哺乳。

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- (1) 正在接受醫生治療的人士
- (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
- (3) 腸胃弱、容易腹瀉的人士

2. 服用後如果出現以下症狀，則有可能是副作用，請立即停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症狀
消化系統	伴隨有劇烈腹痛的腹瀉、腹痛

3. 服用後可能會出現以下症狀，如果此類症狀持續或增強，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

腹瀉

4. 如果服用 5~6 天症狀仍未好轉，請停止服用，持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量，在餐前或餐間以涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時，請在監護人的指導監督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的混合生藥乾燥提取物 1.125g：

日本藥典火麻仁	2.5g
日本藥典大黃	2.0g
日本藥典枳實	1.0g
日本藥典杏仁	1.0g
日本藥典厚樸	1.0g
日本藥典芍藥	1.0g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

保管及使用注意事項

1. 請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
2. 請於幼兒無法觸及之處保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩餘藥劑，請將袋口翻折保存，並在 2 天內服用完畢。
4. 本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等），因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況，但並不影響其功能和效果。
5. 請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>