

中文说明

TSUMURA 汉方 麻黄附子细辛汤 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于体力虚弱、手脚发凉、时有恶寒的人士的以下各种症状：
感冒、过敏性鼻炎、支气管炎、支气管哮喘、神经痛

注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
 - 肠胃弱的人士
 - 上火、面红、体力充沛的人士
 - 容易出汗的人士
 - 老年人
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
 - 有以下症状的人士：
排尿困难
 - 被诊断为患有以下疾病的人士：
高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心呕吐、食欲不振、胃部不适
其他	出汗过多、全身无力感、发热、心悸、上火、燥热、唇舌麻木

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

- 如果服用1个月左右（针对感冒服用时则为5~6天）症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。



用法和用量

请按以下用量, 在餐前用凉开水或温水送服:

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时, 请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中, 含有下述比例的混合生药干燥提取物 0.75g:

日本药典麻黄	2.0 g
日本药典细辛	1.5 g
日本药典附子末	0.5 g

有关添加物: 含有日本药典轻质无水硅酸、日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的, 如袋中尚有剩余制剂, 请将袋口翻折保存, 并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药 (药用的草根树皮等), 因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况, 但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编: 107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>