

한국어판

하이쿠탄 D

[제 3 류 의약품]

효능·효과

자양강장, 허약체질, 육체피로, 병후의 체력저하,
위장장애, 영양장애, 발열성 소모성질환,
임신수유기 중인 경우의 영양 보급

사용상 주의사항

□ 상담이 필요한 경우

- 일정 기간 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 제품(상자)을 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.



용법·용량

다음 양을 1 일 1 회 복용

연령	1 회량
만 15 세 이상	1 병(50mL)
만 15 세 미만	복용하지 말 것

- 용법·용량을 엄수할 것.

성분·분량

(1 병 50mL 중)

녹용 토크 (원생약 환산량: 28mg)	0.10mL
우황 토크 (원생약 환산량: 5mg)	0.50mL
인삼 유동엑스 (원생약 환산량: 600mg)	0.60mL
L-라이신염산염	100mg
글루쿠로놀락톤	50mg
피리독신염산염	5mg
리보플라빈	2mg
니코틴산아미드	20mg
무수카페인	50mg

첨가물로 안식향산나트륨(일본약전), 정제수(일본약전), 백당(일본약전), 꿀(일본약전), 파라옥시안식향산부틸(일본약전), 프로필렌글리콜(일본약전), 에탄올, 구연산, 실리콘수지, D-소르비톨액, 바닐린, 폴리옥시에틸렌경화피마자유 60, DL 사과산, 향료를 함유합니다.

(알코올 함유 0.6mL 이하)

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
2. 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 오용을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 옮겨서 보관하지 말 것.
4. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.
5. 이 약은 생약성분이 포함되어 있어 침전 또는 부유물이 생길 수 있으나, 효능·효과에 차이는 없습니다. 잘 흔들어서 복용해 주십시오.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산·판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.

제조판매원: 닛신 약품공업주식회사 시가현 고카시 고카초 다도노 80-1

발매원:



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>