


くすりのしおり

内服剤

2015年07月改訂

<p>薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。</p>	
<p>商品名:ツムラ五積散エキス顆粒（医療用） 主成分:五積散(goshakusan) 剤形:顆粒剤（淡灰褐色） シート記載: ツムラ五積散(ゴシヤクサン) 2.5g 「63」</p>	
<p>この薬の作用と効果について <u>この薬は漢方薬です。あなたの症状や体質に合わせて処方してあります。</u> 胃腸炎、腰痛、神経痛、関節痛、月経痛、頭痛、冷え症、更年期障害、かぜの治療に使用されます。通常、慢性に経過し、症状の激しくない場合に用いられます。</p>	
<p>次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。狭心症・心筋梗塞などの心臓に障害がある、またはその既往がある。甲状腺機能亢進症がある。重症高血圧症である。 ・妊娠または授乳中 ・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。 	
<p>用法・用量（この薬の使い方）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ あなたの用法・用量は <input type="text"/> く :医療担当者記入>> ・通常、成人は1日7.5gを2～3回に分割し、食前もしくは食間に水またはぬるま湯で飲んでください。年齢、体重、症状により適宜増減されることがあります。必ず指示された服用方法に従ってください。 ・飲み忘れた場合は気がついた時に飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次に決められた時間に飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。 ・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。 ・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。 	
<p>生活上の注意</p>	
<p>この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、発疹、発赤、かゆみ、不眠、発汗過多、頻脈、どうき、体がだるい、興奮する、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢、排尿障害などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる [偽アルドステロン症] ・体がだるくて手足に力が入らない、手足がひきつる、手足がしびれる [ミオパチー] <p>以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。</p>	
<p>保管方法 その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気、高温をさけて保管してください。 ・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。 	
<p>医療担当者記入欄 年 月 日</p>	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。