


くすりのしおり

内服剤

2015年07月改訂

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。そのために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。	
商品名：ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用） 主成分： 芍薬甘草湯(shakuyakukanzoto) 剤形： 顆粒剤（淡灰褐色） シート記載： ツムラ芍薬甘草湯（シャクヤクカンゾウ） 2.5 g 「68」	
この薬の作用と効果について この薬は漢方薬です。あなたの症状や体質に合わせて処方してあります。 こむらがえりなどの急激におこる筋肉のけいれんを伴う痛み、筋肉・関節痛、胃痛、腹痛の治療に使用されます。	
次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。 <ul style="list-style-type: none">・以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。アルドステロン症、低カリウム血症、ミオパチーがある。・妊娠または授乳中・他に薬などを使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、他に使用中の一般用医薬品や食品も含めて注意してください）。	
用法・用量（この薬の使い方） <ul style="list-style-type: none">・あなたの用法・用量は<<< :医療担当者記入>>>・通常、成人1日7.5gを2～3回に分割し、食前もしくは食間に水またはぬるま湯で飲んでください。症状があるときのみ服用する薬なので、症状が改善されたら医師または薬剤師に相談してください。必ず医師の指示された服用方法に従ってください。・飲み忘れた場合は気がついた時に飲んでください。ただし、次に飲む時間が近い場合は1回飛ばして、次に決められた時間に飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。・誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。・医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。	
生活上の注意	
この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用） 主な副作用として、発疹、発赤、かゆみ、悪心、嘔吐、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。 まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。 このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。 <ul style="list-style-type: none">・から咳、息切れ、発熱、呼吸困難 [間質性肺炎]・尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる [偽アルドステロン症]・どうき、息切れ、体がだるい、めまい [うっ血性心不全、心室細動、心室頻拍]・体がだるくて手足に力が入らない、手足がひきつる、手足がしびれる、筋肉痛 [ミオパチー、横紋筋融解症]・体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害] 以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。	
保管方法 その他 <ul style="list-style-type: none">・乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、湿気、高温をさけて保管してください。・薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。	
医療担当者記入欄 年 月 日	

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。