

## 中文說明

# TSUMURA 漢方 防風通聖散 提取物顆粒

【第二類醫藥品】

### 所功能和效果

用於身體強壯，腹部皮下脂肪多、經常便秘的人士的以下各種症狀：  
高血壓或肥胖伴隨的心悸、肩酸、上火、浮腫、便秘、蓄膿症（鼻竇炎）、濕疹或皮膚炎、痤瘡（暗瘡）、肥胖症

### 注意事項

#### ×禁止事項

（如果不遵守、則目前的症狀有可能惡化、或容易引起副作用）

1. 服用本劑的期間、請勿服用以下藥品：其他瀉藥。
2. 哺乳期的人士請勿服用本劑、或者服用本劑期間請勿哺乳

#### □諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：
  - (1) 正在接受醫生治療的人士
  - (2) 孕婦或疑似懷孕的人士
  - (3) 身體虛弱的人士（體力衰弱的人士、體質虛弱的人士）
  - (4) 腸胃弱、容易腹瀉的人士
  - (5) 容易出汗的人士
  - (6) 老年人
  - (7) 至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士
  - (8) 有以下症狀的人士：浮腫、排尿困難
  - (9) 被診斷為患有以下疾病的人士：高血壓、心臟病、腎臟病、甲狀腺機能障礙
2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	噁心、嘔吐、食欲不振、胃部不適、腹脹、伴隨劇烈腹痛的腹瀉、腹痛
精神神經系統	眩暈
其 他	發汗、心悸、浮腫、頭痛

偶爾可能會發生以下嚴重症狀，此時請立即接受醫生的診治：

症狀名稱	症 狀
間質性肺炎	上樓梯或稍做劇烈運動就會氣喘、呼吸困難，出現乾咳、發熱等症狀，此類症狀會突然出現或持續
假性醛固酮增多症、肌病	除手腳酸軟、麻痺、痙攣、僵硬外，還出現乏力感、肌肉痛，並逐漸增強
肝功能障礙	出現發熱、瘙癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身疲憊、食欲不振等
腸系膜靜脈硬化	由於長期服用，反復出現腹痛、腹瀉、便秘、腹脹感等

3. 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：腹瀉、便秘
4. 如果服用1個月左右（針對便秘服用時則為1周左右）症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。
5. 如果需要長期連續服用、請諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。



## 用法和用量

請按以下用量，在餐前以涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時、請在監護人的指導監督下服用。

## 成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中、含有下述比例的防風通聖散提取物 2.25g：

日本藥典滑石	1.5 g
日本藥典黃芩	1.0 g
日本藥典甘草	1.0 g
日本藥典桔梗	1.0 g
日本藥典石膏	1.0 g
日本藥典白朮	1.0 g
日本藥典大黃	0.75 g
日本藥典荊芥	0.6 g
日本藥典山梔子	0.6 g
日本藥典芍藥	0.6 g
日本藥典川芎	0.6 g
日本藥典當歸	0.6 g
日本藥典薄荷	0.6 g
日本藥典防風	0.6 g
日本藥典麻黃	0.6 g
日本藥典連翹	0.6 g
日本藥典無水芒硝	0.35 g
日本藥典生薑	0.15 g

有關添加物：含有日本藥典輕質無水矽酸、日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物

## 保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的、如袋中尚有剩餘藥劑、請將袋口翻折保存、並在 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等）、因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況、但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11

<http://www.tsumura.co.jp/>