

# 中文说明

## TSUMURA 汉方葛根汤液 2

【第二类医药品】

### 功能和效果

用于中等体力以上人士的以下各种症状：

感冒初期（不出汗型）、伤风、鼻炎、头痛、肩酸、肌肉痛、手或肩膀痛



### 注意事项

#### □咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
- (4) 肠胃弱的人士
- (5) 容易出汗的人士
- (6) 老年人
- (7) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- (8) 有以下症状的人士：  
    浮肿、排尿困难
- (9) 被诊断为患有以下疾病的人士：  
    高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本产品（盒子）咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心、食欲不振、胃部不适

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强
肝功能障碍	出现发热、瘙痒、发疹、黄疸（皮肤和眼白变黄）、褐色尿、全身疲惫、食欲不振等

3. 如果服用 1 个月左右（针对感冒初期、伤风、头痛服用时则服用 5-6 次）症状仍未好转，请停止服用，持本产品（盒子）咨询医生、药剂师或注册销售人员。

4. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。

## 用法和用量

请按以下用量，在餐间服用：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 瓶	2 次
未满 15 岁	请勿服用	

请在服用前充分摇匀后服用。

<用法用量的相关注意事项>

请注意服用本剂时 1 次喝完 1 瓶，不要喝剩。

## 成分和含量

本品 1 天用量 90mL（45mL×2 瓶）中，含有从下述生药中提取的葛根汤提取物 8.3g：

日本药典葛根	8.0g
日本药典麻黄	4.0g
日本药典大枣	4.0g
日本药典桂皮	3.0g
日本药典芍药	3.0g
日本药典甘草	2.0g
日本药典生姜	1.0g

有关添加物：含有转化糖浆（白糖、果糖、葡萄糖）、日本药典蜂蜜、日本药典苯甲酸钠、对羟基苯甲酸丁酯、乙醇、聚氧乙烯氢化蓖麻油、日本药典柠檬酸水合物、日本药典碳酸氢钠、香料、乙基香兰素、甘油、香草醛、1,2-丙二醇

## 标签注意事项

- (1) 服用时，请仔细阅读盒子背面的说明书。
- (2) 由于可能会有不适合服用的情形，因此服用前请先咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- (3) 请在阳光直接照射不到的阴凉之处保存。
- (4) 请在幼儿无法触及之处保存。
- (5) 为避免误用及为保持品质，请勿转放入其他容器。
- (6) 请勿服用已过保质期的产品。

## 净含量

45mL×2 瓶装（1 天用量）

## 制造销售商

大同药品工业株式会社 邮编：639-2121 奈良县葛城市新村 214 番地 1

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>