

中文说明

TSUMURA 汉方葛根汤加川芎辛夷提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

比较有体力的人士的以下各种症状：鼻塞、积脓症（鼻窦炎）、慢性鼻炎

注意事项

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）
- (4) 肠胃弱的人士
- (5) 容易出汗的人士
- (6) 老年人
- (7) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- (8) 有以下症状的人士：
 浮肿、排尿困难
- (9) 被诊断为患有以下疾病的人士：
 高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

| 相关部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮 肤 | 发疹、发红、瘙痒 |
| 消化系统 | 恶心、食欲不振、胃部不适 |

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

| 症状名称 | 症 状 |
|-------------|----------------------------------|
| 假性醛固酮增多症、肌病 | 除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强 |

3. 如果服用1个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

4. 如果需要长期连续服用，请咨询医生、药剂师或注册销售人员。



用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

| 年 龄 | 1 次用量 | 1 天服用次数 |
|--------------|--------------|---------|
| 15 岁及以上成人 | 1 包 (1.875g) | 2 次 |
| 7 岁以上未满 15 岁 | 2/3 包 | |
| 4 岁以上未满 7 岁 | 1/2 包 | |
| 2 岁以上未满 4 岁 | 1/3 包 | |
| 未满 2 岁 | 请勿服用 | |

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的葛根汤加川芎辛夷提取物 2.0g：

| | |
|--------|------|
| 日本药典葛根 | 2.0g |
| 日本药典大枣 | 1.5g |
| 日本药典麻黄 | 1.5g |
| 日本药典桂皮 | 1.0g |
| 日本药典芍药 | 1.0g |
| 日本药典辛夷 | 1.0g |
| 日本药典川芎 | 1.0g |
| 日本药典生姜 | 0.5g |

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>