

# 한국어판

## 쯔무라 한방 반하후박탕 엑스 과립

[제 2 류 의약품]

### 효능·효과

평균체력을 기준으로 기분이 우울하고 인후, 식도에

이물감이 있으며, 때때로 두근거림, 어지러움, 구역질 등을

수반하는 다음의 증상:

불안신경증, 신경성 위염, 입덧, 기침, 쉼 목소리, 목 안에 무엇이

걸려 있는 느낌



### 사용상 주의사항

#### □ 상담이 필요한 경우

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.

(2) 지금까지 약 등으로 인해 발진, 발적, 가려움 등이 발생한 적이 있는 사람.

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 문서를 소

지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움

3. 1 개월 정도(입덧에 복용하는 경우에는 5~6 일 동안) 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고

이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

## 용법·용량

다음 양을 식전에 물 또는 따뜻한 물과 함께 복용

연령	1 회량	1 일 복용 횟수
만 15 세 이상	1 포(1.875g)	2 회
만 7 세 이상 만 15 세 미만	2/3 포	
만 4 세 이상 만 7 세 미만	1/2 포	
만 2 세 이상 만 4 세 미만	1/3 포	
만 2 세 미만	복용하지 말 것	

<용법·용량에 관한 주의 사항>

소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용

## 성분 · 분량

본 제품 2 포(3.75g)에는 아래와 같은 비율의 반하후박탕 엑스 1.25g 을 함유합니다.

반하(일본약전)	3.0 g
복령(일본약전)	2.5 g
후박(일본약전)	1.5 g
소엽(일본약전)	1.0 g
생강(일본약전)	0.5 g

첨가물로 스테아르산마그네슘(일본약전), 유당수화물(일본약전), 자당지방산에스테르를 함유합니다.

## 보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
2. 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
3. 1 포를 분할한 후 잔량을 사용할 경우에는 입구를 접어서 보관하고, 2 일 이내에 복용할 것.
4. 이 약은 생약(약용 초근목피 등)을 사용한 제품이므로 제품에 따라 다소 과립의 색조 등이 다를 수 있으나, 효능 · 효과에 차이는 없습니다.
5. 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산 · 판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.

