

中文说明

TSUMURA 汉方口服液麻黄汤

【第二类医药品】

功能和效果

用于体力充沛，感冒初期、风寒发热、有头痛、咳嗽、身体关节痛而不出汗的人士的以下各种症状：

感冒、伤风、支气管炎、鼻塞



注意事项

×禁止事项

(如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用)

1. 以下人士请勿服用：

身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）

2. 仅限短期服用，请勿连续服用

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：

- (1) 正在接受医生治疗的人士
- (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
- (3) 肠胃弱的人士
- (4) 容易出汗的人士
- (5) 老年人
- (6) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- (7) 有以下症状的人士：
浮肿、排尿困难
- (8) 被诊断为患有以下疾病的人士：
高血压、心脏病、肾脏病、甲状腺机能障碍

2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本产品（盒子）咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	恶心、食欲不振、胃部不适
其 他	出汗过多、全身无力感

偶尔可能会发生以下严重症状。此时请立即接受医生的诊治：

症状名称	症 状
假性醛固酮增多症、肌病	除手脚酸软、麻痹、痉挛、僵硬外，还出现乏力感、肌肉痛，并逐渐增强

3. 如果服用 1 个月左右（针对感冒、伤风服用时则服用 5-6 次）症状仍未好转，请停止服用，持本产品（盒子）咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前或餐间充分摇匀后服用：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 瓶	3 次
未满 15 岁	请勿服用	

注) 餐间是指“两餐之间”，例如早餐和午餐之间。

不是指在用餐过程中服用。

<用法用量的相关注意事项>

- (1) 请严格遵守用法和用量。
- (2) 本剂本质上含有沉淀，因此服用前请先充分摇匀后服用。

成分和含量

本品 1 天用量 90mL (30mL×3 瓶) 中，含有从下述生药中提取的麻黄汤提取物 81mL：

日本药典麻黄	5.0g
日本药典杏仁	5.0g
日本药典桂皮	4.0g
日本药典甘草	1.5g

有关添加物：含有白糖、对羟基本甲酸酯、香料（含乙醇、甘油、1,2-丙二醇、薄荷醇）

注意事项

(1) 以下人士请勿服用：

身体虚弱的人士（体力衰弱的人士、体质虚弱的人士）

- (2) 由于可能会有不适合服用的情形，因此服用前请先咨询医生、药剂师或注册销售人员。
- (3) 服用时，请仔细阅读盒子背面的说明书。
- (4) 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
- (5) 请在幼儿无法触及之处保存。
- (6) 为避免误用及为保持品质，请勿转放入其他容器。
- (7) 请勿服用已过保质期的产品。
- (8) 开瓶后请全部喝完。
- (9) 请勿在开瓶后的状态下保存。

净含量

30mL×3 瓶装（1 天用量）

制造销售商

新生药品工业株式会社 奈良县高市郡高取町清水谷 1269

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>