

中文說明

TSUMURA 漢方 八味地黃丸料 提取物顆粒 A

【第二類醫藥品】

功能和效果

用於中等體力以下、容易疲勞、容易四肢冰冷、尿量減少或者多尿、時有口渴的人士的以下各種症狀：

下肢疼痛、腰痛、麻痺、老年人視物模糊、瘙癢、排尿困難、殘尿感、夜尿、尿頻、浮腫、改善高血壓的伴隨症狀（肩酸、頭沉、耳鳴）、輕微漏尿



注意事項

×禁止事項

（如果不遵守、則目前的症狀有可能惡化、或容易引起副作用）

以下人士請勿服用：

- （1）腸胃弱的人士
- （2）容易腹瀉的人士

□諮詢事項

1. 以下人士請在服用前諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

- （1）正在接受醫生治療的人士
- （2）孕婦或疑似懷孕的人士
- （3）易上火、面色赤紅並身體強壯的人士
- （4）至今曾有過因藥物等而引起發疹、發紅、瘙癢等症狀的人士

2. 服用後如果出現以下症狀、則有可能是副作用、請立即停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

相關部位	症 狀
皮 膚	發疹、發紅、瘙癢
消化系統	食欲不振、胃部不適、腹痛
其 他	心悸、上火、嘴唇或舌頭髮麻

3. 服用後可能會出現以下症狀、如果此類症狀持續或增強、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員：

腹瀉

4. 如果服用 1 個月左右症狀仍未好轉、請停止服用、持本說明書諮詢醫生、藥劑師或註冊銷售人員。

用法和用量

請按以下用量、在餐前以涼開水或溫水送服：

年 齡	1 次用量	1 天服用次數
15 歲及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 歲以上未滿 15 歲	2/3 包	
4 歲以上未滿 7 歲	1/2 包	
2 歲以上未滿 4 歲	1/3 包	
未滿 2 歲	請勿服用	

<用法用量的相關注意事項>

幼兒服用時、請在監護人的指導監督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的八味地黃丸提取物 2.0g：

日本藥典地黃	3.0 g
日本藥典山茱萸	1.5 g
日本藥典山藥	1.5 g
日本藥澤瀉	1.5 g
日本藥典茯苓	1.5 g
日本藥典牡丹皮	1.25 g
日本藥典桂皮	0.5 g
日本藥典附子末	0.25 g

有關添加物：含有日本藥典硬脂酸鎂、日本藥典乳糖水合物、蔗糖脂肪酸酯

保管及使用注意事項

- 1.請於陽光直接照射不到的陰涼乾燥之處保存。
- 2.請於幼兒無法觸及之處保存。
- 3.1 包分次服用的、如袋中尚有剩餘藥劑、請將袋口翻折保存、並在 2 天內服用完畢。
- 4.本劑使用了生藥（藥用的草根樹皮等）、因此產品的顆粒可能會存在有些許色調差異等情況、但並不影響其功能和效果。
- 5.請勿服用已過保質期的產品。

本產品依照日本法律取得生產、銷售許可。



郵遞區號：107-8521 東京都港區赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>