

# 한국어판

## 쓰무라 한방 당귀작약산 엑스 과립

[제 2 류 의약품]

### 효능 · 효과

체력이 허약하고 냉증으로 빈혈의 경향이 있으며

쉽게 피로하고 때때로 하복부통, 머리 무거움, 어지러움, 어깨 결림,

이명, 두근거림 등을 호소하는 사람의 다음과 같은 증상:



월경불순, 월경이상, 월경통, 갱년기장애, 산전산후 또는 유산에

의한 장애(빈혈, 피로권태, 어지러움, 부종), 어지러움, 현기증,

머리 무거움, 어깨 결림, 요통, 하지의 냉증, 가벼운 동상, 부종,

기미, 이명

### 사용상 주의사항

#### □ 상담이 필요한 경우

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 사람.

(2) 위장이 약한 사람.

(3) 지금까지 약 등으로 인해 발진, 발적, 가려움 등이 발생한 적이 있는 사람.

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성성이 있으므로 즉시 복용을 중지하고 이 문서를 소

지하여 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담합니다.

관련 부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	식욕부진, 위부불쾌감

3. 1 개월 정도 복용해도 증상이 호전되지 않는 경우에는 복용을 중지하고 이 문서를 소지하여 의사, 약사 또는 등

록판매자와 상담합니다.

## 용법 · 용량

다음 양을 식전에 물 또는 따뜻한 물과 함께 복용

연령	1 회량	1 일 복용 횟수
만 15 세 이상	1 포(1.875g)	2 회
만 7 세 이상 만 15 세 미만	2/3 포	
만 4 세 이상 만 7 세 미만	1/2 포	
만 2 세 이상 만 4 세 미만	1/3 포	
만 2 세 미만	복용하지 말 것	

<용법 · 용량에 관한 주의 사항>

소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 복용

## 성분 · 분량

본 제품 2 포(3.75g)에는 아래와 같은 비율의 당귀작약산 엑스 2.0g을 함유합니다.

작약(일본약전)	2.0 g
창출(일본약전)	2.0 g
택사(일본약전)	2.0 g
복령(일본약전)	2.0 g
천궁(일본약전)	1.5 g
당귀(일본약전)	1.5 g

첨가물로 스테아르산마그네슘(일본약전), 유당수화물(일본약전)을 함유합니다.

## 보관 및 취급상의 주의

- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 어린 아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 1 포를 분할한 후 잔량을 사용할 경우에는 입구를 접어서 보관하고, 2 일 이내에 복용할 것.
- 이 약은 생약(약용 초근목피 등)을 사용한 제품이므로 제품에 따라 다소 과립의 색조 등이 다를 수 있으나, 효능 · 효과에 차이는 없습니다.
- 사용기한을 넘긴 제품은 복용하지 말 것.

이 글은 일본어를 한국어로 번역한 글이며, 법적 규제가 있는 첨부문서와는 다릅니다.

이 제품은 일본의 법률에 따라 생산 · 판매되는 것을 전제로 승인받았습니다.



(우)107-8521 도쿄도 미나토구 아카사카 2-17-11 <https://www.tsumura.co.jp/>